

Krabbameinsverkir

Hvaða krabbameinsverkir flokkast undir bráðir verkir?

Procedural pain og fylgikvillar

Hvað er procedural pain í krabbameinsverkjum?

Verkir tengdir rannsóknum og meðferð

Nefndu dæmi um krabbameinsverki sem flokkast undir fylgikvilla?

Blóðtappi og sýkingar

Hverskonar krabbameinsverkir flokkast undir fylgikvillar?

Sýkingar og blóðtappar

Hvaða flokkar krabbameinsverkja flokkast undir langvinnir verkir?

Framgangur sjúkdóms, meðferð og aðrir langvinnir verkir

Nefndu dæmi um langvinna krabbameinsverki tengt framgang sjúkdóms;

Meinvörp, æxli þrýstir á vefi, lokun á líffærum t.d. görn og þvagleiðarar

Nefndu dæmi um langvinna verki tengda krabbameinsmeðferð ;

Eftir skurðaðgerð, lyfjameðferð og geisla

Af hverju fá krabbameinssjúklingar taugaverki?

Getur verið vegna krabbameinsins, eða iatrogenic; skurðaðgerð, lyfjameðferð og geislar

Hægt er að skipta verk gróflega í tvo hópa

Vefjaverkun (bein, mjúkvæfur, líffæri) og taugaverkir

Hvað orsakar taugaverki hjá krabbameinssjúklingum?

Þrýstingur á taugar og innvöxtur í taugar

Hvað eru gegnumbrotsverkir (breathrough pain)?

Skammvinn versnun á verkjum sem kemur fram fyrirvaralaust eða í tengslum við ákveðið áreiti hjá sjúklingum sem eru á stöðugri verkjameðferð fyrir.

Krabbameinsverkir (cont)

Hvernig eru verkir þeirra sem fá oft gegnumbrotsverki?

Þeir eru gjarnarn með aukna verki í grunninn

Er hægt að spá fyrir flestum gegnumbrotsverkjum?

Nei, talið að 80% séu tilvik sem ekki er hægt að spá fyrir um

Hvaða þættir þurfum við að taka til greina í verkjamati sem hefur áhrif á verki sjúklinga?

Andlegir og trúarlegir þættir, áhyggjur sjúklings, þættir sem hafa áhrif á verkjapól

Hvaða þættir minnka verkjapól?

Vanlíðan, svefnleysi, þreyta, kvíði, ótti, reiði, leiði, félagsleg einangrun og einmannaleiki

Hvaða þættir auka verkjapól?

Góð einkennameðferð, góður svefn, hvíld, sjúkráþjálfun, slökun, stuðningur, skilningur, afþreying, félagskapur, andleg velliðan, skilningur og hlustun

Hvað er stutt verkjaskrá (brief pain inventory)?

Mælitæki sem metur fjölþætt áhrif verkja

Hvað er ESAS?

Verkjamat sem metur verki og önnur algeng einkenni

Hverju megum við ekki gleyma við verkjamat?

Gera líka líkamsmat og rannsóknir eftir því sem við á

Nefndu þætti í fræðslu um verkjameðferð

Hvatning, skoða hindrandi viðhrof, virkja sjúkling og aðstandendur, verkjadagbók og útskriftarfræðsla

Hverju megum við ekki gleyma varðandi fjölþætt áhrif verkja?

Verkir hafa líka andleg, tilvistarleg og fjárhagsleg áhrif.

Krabbameinsverkir (cont)

Í hverju felast markmið verkjameðferð krabbameinssjúklinga?

Fyrirbyggging, minnka verki, fyrirbyggja og meðhöndla aukaverkanir verkjameðferðar.

Nefndu algengustu meðferðarúrræði við krabbameinsverkjum;

Verkjalyf, stoðlyf, aðgerðir, lyfja og geislameðferð, sjúkráþjálfun, endurhæfin og aðrar aðferðir en lyf

Af hverju er best af gefa verkjalyf um munn í krabbameinsverkjum?

Þetta er leiðin sem gefur jöfnustu virknina. Hagkvæmt, ódýrt,

Hvenær myndum við frekar nota verkjalyf eftir þörfum en fast?

Ef verkir koma í köstum, ef verkir eru stöðugir eru notuð lyf reglulega

Hvað þýðir hugtakið "by the ladder" í verkjameðferð?

Nota leiðbeiningar eftir alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um hvernig á að meðhöndla verki.

Hvernig metum við árangur verkjameðferðar?

Við metum reglulega, með viðurkenndum kvarða, amk daglega á legudeildum og sjúklingar meta sjálfir.

Hvaða spurninga spyrð þú í upplýsingasöfnun verkja?

SOCRATES; Size, Onset, Character, Radiate, Associated symptoms, Time/duration, Exacerbating factors, Severity

Size-Staðsetning. Onset- Byrjun. Character-Eiginleiki. Radiate- Dreifing. Associated symptoms. Time/duration- Lengd. Exacerbating factors – Versnar-batnar. Severity – Styrkur.

SOCRATES: Size

Staðsetning

Krabbameinsverkir (cont)

SOCRATES: Onset

Hvenær byrjaði verkurinn og við hvaða aðstæður?

SOCREATES: Character

Hvernig lýsir verkurinn sér?

SOCRATES: Radiates

Leiðir eða dreifir verkurinn sér eitthvað?

SOCRATES: Associated symptoms

Ógleði, krampi

SOCRATES: Time, duration

Hversu lengi hafa þeir verið?

SOCRATES: Exacerbating factors

Hvaða þættir gera verkinn betri eða verri?

SOCRATES: Severity

Styrkur á kvarða

Hvaða upplýsingar erum við að leita af þegar við spurjum sjúklinga um fyrri verkjameðferð?

Fyrri meðferð og árangur af henni.

Hvað er verkjastigi WHO?

Leiðbeiningar um verkjameðferð og að meðferð eigi að miðast við styrk verkja.

Hvað þýðir það að verkjameðferð eigi að miðast við styrk verkja?

Að við veljum tegund verkjalyfja út frá styrk verkja – ~~hér er ekki átt við um skammtastærð lyfja~~

Nefndu reglu varðandi tegund lyfja notuð í verkjameðferð;

Við notum einungis eina tegund lyfja úr sama flokki – t.d. fólk er ekki á 2 tegundir af bólgueyðandi verkjalyfjum eða 2 tegundum af sterkum verkjalyfjum

Hverskonar lyf eru notuð við gegnumbrotsverki?

Lyf eftir þörfum

WHO verkjastigi: Prep 1 (Verkir 1-2)

Parasetamól og/eða NSAID. +/- Stoðlyf

Krabbameinsverkir (cont)

Anna er með verki í baki upp á 2. Hún er einnig með taugaverki í handlegg. Hvaða WHO verkjameðferð er ráðlögð fyrir Önnu?

Parasetamól/NSAID. Sýnt að það er betra að nota bæði frekar en einungis annað. Svo stoðlyf eins og gabapentin fyrir taugaverk

WHO verkjastigi: Prep 2 (Verkir 3-6)

Parasetamól og/eða NSAID. +/- Veikir ópíóðar. +/- Stoðlyf

Andrés er með verk í kvið upp á 5. Hverskonar WHO verkjameðferð gætum við gefið honum?

Parasetamól/ NSAID og veika ópíóða eins og tramadol eða kódein.

WHO verkjastigi: Prep 3 (Verkir 7-10)

Parasetamól og/eða NSAID. +/- Sterkir ópíóðar. +/- Stoðlyf

Alex hefur verið með verki upp á 5. Hún er búin að vera fá parasetamól og NSAID, ásamt tramadol (veikum ópíóðum). Alex hefur verið að fá mikið af gegnumbrota-verkjum upp á síkastið og núna er hún að skora verk upp á 9. Hverskonar verkjameðferð veitum við hani núna?

Höldum áfram með parasetamól/NSAID, við tökum út veika ópíóðana en bætum inn sterkum ópíóðum eins og morfín, oxycodone eða fentanýl

Verkjalyfjameðferð

Við hverju eru væg og bólgueyðandi lyf notuð í krabbameinverkjameðferð?

T.d. notuð við verkjum í meinvörpum í beinum

Hvaða NSAID lyf er best að gefa við verkjum og hvað er best við bólgu?

Ekkert NSAID lyf eru öðru fremra sem verkjalyf eða bólgueyðandi lyf

Verkjalyfjameðferð (cont)

Hverjir eru kostir NSAID lyfja í verkjameðferð?

Þau minnka þörf fyrir ópíóða þegar þau eru gefin samhliða

Nefndu tvo áhættuhópa fyrir NSAID lyfjum

Blóðgflögufæð og skert nýrnastarfsemi

Hvaða lyf getum við gefið ef NSAID lyf sem við gáfum dugaði ekki fyrir sjúkling?

Prófa annað NSAID lyf

Hverjir eru kostir ópíóða í verkjameðferð krabbameins?

Þessi lyf eru auðveld að titra og eru til í mörgum formum

Hverjar eru nursing considerations við gjöf ópíóða?

Þekkja verkunartíma og meðhöndla aukaverkanir

Hvernig myndum við gefa ópíóða fyrir vel verkjastilltan sjúkling?

Langverkandi ópíóði um munn

Hvenær veljum við að gefa ópíóða undir húð með lyfjadælu?

Ef sjúklingur getur ekki PO - T.d. kyningarörðuleikar

Hverjir fá verkjaplástur í verkjameðferð?

Þeir sem geta ekki PO og eru vel verkjastilltir.

Hvenær á aldrei að gefa verkjaplástur í verkjameðferð?

EKKI notað sem upphadslyf né við bráðaverkjum

Nefndu 2 ábendingar fyrir notkun fentanýl plásturs;

1. Getur ekki kyngt. 2. illvæg hægðatregða.

Verkjalýfjameðferð (cont)

Hverskonar sjúklingar eru með fentanýl plástur í verkjameðferðinni sinni?

Sjúklingar sem eru vanir ópíóðum – þetta er yfirleitt ekki fyrsta lyf

Hversu lengi tekur það PO ópíóða að byrja að virka

30-60 mín

Hversu lengi tekur það ópíóða gefin SC að byrja virka?

10-20 mín

Hversu lengi tekur það ópíóða að byrja að virka sem gefin IV?

5-10 mín

Hversu lengi varir ópíóði gefin PO, SC?

3-6 klst

Hversu lengi varir ópíóði gefin IV á móti langverkandi ópíóða?

IV ópíóði varir í 1-2 klst á meðan langverkandi varir í 8-12 klst.

Hversu algengt er öndunarslæving að völdum ópíóða?

Sjaldgæft

Hverjir eru áhættuþópar fyrir öndunarslævingu að völdum ópíóða?

1. Sjúklingar óvanir ópíóðum 2. Aldraðir 3. Lungnasjúklingar og kæfisvefn 4. Fólki á slævandi lyfjum

Hverjar eru orsakir öndunarslævingar hjá sjúklingum með langvinna krabbameinsverki eftir gjöf ópíóða?

1. Of hröð hækkan ópíóða 2. Skert nýrnastarfsemi og lyfin hlaðast upp 3. Óvissa um jafngildisskammta 4. Of stór skammtur af ópíóðum

POSS kvarði: Rósa er vakandi, skýr og spjallar við þig um kettina sína.

Skorar 0

Verkjalýfjameðferð (cont)

POSS kvarði: Guðmundur er syfjaður, en þú nærð auðveldlega að vekja hann.

Skorar 1

POSS kvarði: Madis er frekar sljór, hún var sofandi en þú vaktir hana auðveldlega.

Skorar 2. Ég athuga öndun, súrefnismettun og klínískt ástand

POSS kvarði: Kriss hefur verið sljór, syfjuð og erfit að vekja.

Skorar 3. Ég gríp strax til aðgerða

POSS kvarði: Bjartur er algjörlega sofandi. Ég næ ekkert að vekja hann.

Skorar S. Eftirlit með öndun, súrefnimettun og klínískt ástand

Hver eru tvö aðal einkenni öndunarslævingar?

Skert meðvitund Öndun <8/mín

Bjartur hefur fengið of háan skammt af ópíóðum. Hann er sofandi, andar grunnt og súrefnimettun er lækkandi. Hver er meðferðin við þessu?

Ég blanda eina lykju - 0.4 mg af naloxóni í 9 ml saltvatni í sprautu. Ég gef 1-2 ml á 30-60 mín fresti þar til einkennin batna. Ég endurtek vegna stutts helmingunartíma

Bjartur vaknar og það hellist yfir hann ógleðin; hann kastar upp, svitnar, er tachycard og er með mikla verki. Hvað gerðist?

Hann hefur verið líkamlega háður ópíóðum og er komin með fráhrarvseinkenni. Ég gaf líklega of stóran naloxón skammt á of stuttum tíma.

Nefndu nokkur stoðlyf

Bisfosfónöt, þríhringlaga þunglydislyf, sterar, kannabis

Við hverju er stoðlyfið bisfosfónöt notuð?

Beinmeinvörp

Verkjalýfjameðferð (cont)

Hvaða þríhringlaga þunglydislyf eru notuð sem stoðlyf í verkjameðferð krabbameins?

Aamitryptilín/ flogalyf (gabap- entin, karbamazepín) við taugaverkjum

Hvenær eru sterar notaðir sem stoðlyf í krabbameinsmeðferð

Þau eru notuð við erfiðum taugaverkjum

Við hvaða einkennum er verið að nota kannabis í stoðmeðferð við krabbameini?

Ógleði, uppköst og lystarleysi

Hverskonar lyf eru alltaf notuð eftir þörfum?

Stuttverkandi lyf, aldrei gefið langverkandi

Hvaða gjafaleiðir verkjalýfja eru notuð eftir þörfum?

IV, SC, PO, buccal, intranasal

Hvaða skammtastærð er notuð í verkjameðferð eftir þörfum?

1/6 af sólarhringsskammti, en hærra ef stórir skammtar af ópíóðum í grunnin

Hvenær ætti að hækka grunnskammt verkjalýfja eftir þörfum?

Ef PN skammtar eru gefnir 3 eða oftar á dag

Hvað gerum við í PN verkjameðferð ef grunnskamturinn var hækkaður?

Þá hækku við PN skamtinn

Hvernig hækku við PN verkjalýfjaskammta?

Nota prósentuhlutfall (ekki mg) og hækkið í samræmi við styrk verkja

Hækkun PN lyfja; NRS 2-3

Hækka um 10%

Hækkun PN lyfja; NRS 4-5

Hækka um 30%

Hækkun PN lyfja; NRS 6-8

Hækka um 50%

Hækkun PN lyfja; NRS 8-10

Hækka um 100%

Verkjalýfjameðferð (cont)

Sjúklingur er á t. Contalgin 60mg x 2 (120mg/sólarhring). Verkir eru núna 4-5. Hversu mikið hækkar þú og hvað er þá skammturinn mikill?

Hækka um 30% = 156mg/sólarhring (80mg x 2)

Sjúklingur er á t. Contalgin 156mg/sólarhring (80mg x 2) Ef verkir eru 6 - 8, hversu mikið hækkar þú og hvað er þá skammturinn mikill?

Hækka um 50% = 180mg/sólarhring (90mg x 2)

Hvenær á að reikna jafngildiskammt í ópíólyfjagjöf?

Alltaf ef skipta þarf um ópíóða hjá sjúkling

Út frá hvaða gildum er jafngildiskammtar alltaf reiknaðir?

Út frá sólarhringsskammti

Af hverju þarf oft að minnka skammt nýs ópíóðs um 30-50%?

Því krossþol milli ópíóða er mismunandi

Hverjar eru aukaverkanir NSAID lyfja og hvernig fyrirbyggjum við þær?

Magabóllgurr/maagasár. Gefa prótónpumpuhemla fyrirb- yggjandi f. áhættuhópa

Hverjar eru aukaverkanir ópíóða sem allir fá?

Hægðatregða

Hvernig fyrirbyggjum við hægðatregðu hjá sjúklingum á ópíóðum?

ALLIR á hægðalyfjum fyrirbygg- jandi frá 1. degi.

Hverjri eru í áhættuhópi fyrir hægðatregðu á ópíóðum?

Lyf sem örva þarmahrey- fingar + mýkjandi lyf